

CS

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

FENOX

Typ přípravku (typy přípravků)

PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců

Číslo povolení: CZ-0031174-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: CZ-0031174-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Obchodní název (názy) přípravku

Obchodní název (názy)	FENOX PHOBI FENOX ETOF 300 CONCENTRATE ETOFENPROX 300 CONCENTRATE INSECTICIDE 300 C&F CONCENTRATE
-----------------------	--

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	LODI S.A.S.
	Adresa	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francie
Číslo povolení	CZ-0031174-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	CZ-0031174-0000	
Datum udělení povolení	27/08/2024	
Datum skončení platnosti povolení	29/11/2027	

1.3. Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno (název) výrobce	LODI SAS
Adresa výrobce	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francie
Umístění výrobních závodů	LODI SAS site 1 Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francie

1.4. Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)

Účinná látka	Etofenprox
Jméno (název) výrobce	Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc.
Adresa výrobce	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi 103-002 7 Chuo-ku, Tokyo Japonsko
Umístění výrobních závodů	Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc. site 1 Omuta Works, 30 Asamuta-cho, Omita 836-8610 Fukuoka Japonsko

Kapitola 2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Etofenprox	3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether	účinná látka	80844-07-1	407-980-2	29,34 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení

EC Emulgovatelný koncentrát

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H362: Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P201: Před použitím si obzorejte speciální instrukce. P260: Nevdechujte aerosoly. P263: Zabraňte styku během těhotenství a kojení. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obal v souladu s místními předpisy.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ

4.1. Popis použití

Tabulka 1. profesionální použití – vnitřní prostory

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: <i>Blattella germanica</i> Obecný název: ostatní: Rus domácí Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: <i>Blattella germanica</i> Obecný název: ostatní: Rus domácí Vývojové stadium: nymfy Latinský název: ostatní: <i>Blatta orientalis</i> Obecný název: ostatní: Šváb obecný Vývojové stadium: nymfy Latinský název: ostatní: <i>Blatta orientalis</i> Obecný název: ostatní: Šváb obecný Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: <i>Tribolium confusum</i> Obecný název: ostatní: Potemník skladištní Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: <i>Sitophilus oryzae</i> Obecný název: ostatní: Pilous rýžový Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: <i>Rhyzopertha dominica</i> Obecný název: ostatní: Korovník obilní Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: <i>Oryzaephilus surinamensis</i> Obecný název: ostatní: Lesák skladištní Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: <i>Lasioderma serricorne</i> Obecný název: ostatní: Červotoč tabákový Vývojové stadium: larvy Latinský název: ostatní: Lezoucí hmyz včetně švábů Obecný název: ostatní: Lezoucí hmyz včetně švábů Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: Lezoucí hmyz včetně švábů Obecný název: ostatní: Lezoucí hmyz včetně švábů Vývojové stadium: nymfy
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách

	Vnitřní prostory budov (obecní budovy, zemědělský a potravinářský průmysl, obytné domy)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání Podrobný popis: Postřik povrchů
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 0.5 ml/m ² Ředění (%): 0,5 ml přípravku FENOX v 50 ml vody na m ² Počet a načasování aplikace: - Příklad se používá zředěný vodou v poměru 0,5 ml přípravku na 50 ml vody na 1 m ² . - Poměr ředění ve výši 1 % odpovídá rozpuštění 1 sáčku (5 ml) v 500 ml vody (tento objem vystačí na plochu 10 m ²). Na 1 m ² je třeba nanést 50 ml takto zředěného přípravku. - Residuální účinek: až 12 týdnů proti švábům a až 2 týdny proti škůdcům skladovaných potravin. - Biocidní účinek se projeví během několika minut. - Maximálně 2 aplikace ročně.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Plastová lahvička: PEHD, PET nebo PEHD/EVOH*: Do 1 litru Ve vodě rozpustné sáčky z PVAL po 5 ml, 10 ml nebo 25 ml balené v PS krabičkách: až 250 ml (50 sáčků po 5 ml, 25 sáčků po 10 ml nebo 10 sáčků po 25 ml). *EVOH = etylenvinylalkohol = PVAL = polyvinylalkohol

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

- Při přizpůsobování ošetření zohledněte vývojové stádium a vlastnosti cílového hmyzu. Zaměřte se zejména na nejcitlivější vývojové stádium cílového organismu, na načasování aplikace a ošetřované plochy.

- Využívejte metody integrované ochrany proti škůdcům, jako je kombinace chemických, fyzických a dalších metod ochrany veřejného zdraví, s ohledem na lokální specifika (klimatické podmínky, cílové druhy, podmínky použití atd.).

- Vyhněte se výhradnímu a opakovanému použití insekticidů ze stejné podskupiny. Podle klasifikace IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) patří etofenprox do podskupiny 3A. (<https://irac-online.org/mode-of-action/classification-online/>).

- Střídejte přípravky s různými účinnými látkami s různými způsoby účinku (tj. s odlišnou klasifikací IRAC).

- Přípravek by měl být aplikován na vyhrazená místa, která nejsou pravidelně umývána a ve kterých se mohou skrývat cílové organismy, např. za nebo pod lednicí, pod dřezem, pod troubou nebo pod bojlerem nebo v různých otvorech a škvírách.

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

- Při míchání a plnění používejte ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

- Během postřiku používejte ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku), nepropustnou kombinézu a dýchací masku (APF 4).

- Při čištění stříkacího zařízení používejte ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku) a potaženou kombinézu.

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

4.2. Popis použití

Tabulka 2. Profesionální použití – vnitřní prostory – Štěnice domácí

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: Cimex lectularius Obecný název: ostatní: Štěnice domácí Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: Cimex lectularius Obecný název: ostatní: Štěnice domácí Vývojové stadium: nymfy
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorech Vnitřní prostory budov (obecní budovy, zemědělský a potravinářský průmysl, obytné domy)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání Podrobný popis: Postřik povrchů
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 0.5 ml/m² Ředění (%): 0,5 ml přípravku FENOX v 50 ml vody na m² Počet a načasování aplikace: - Přípravek se používá zředěný vodou v poměru 0,5 ml přípravku na 50 ml vody na 1 m². - Poměr ředění ve výši 1 % odpovídá rozpuštění 1 sáčku (5 ml) v 500 ml vody (tento objem vystačí na plochu 10 m²). Na 1 m² je třeba nanést 50 ml takto zředěného přípravku. - Reziduální účinek: až 12 týdnů v případě štěnic. - Aplikaci je potřeba po 15 dnech zopakovat. K vyhubení dojde týden po druhé aplikaci. - Biocidní účinek se projeví během několika minut. - Maximálně 2 aplikace ročně.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Plastová lahvička: PEHD, PET nebo PEHD/EVOH*: Do 1 litru Ve vodě rozpustné sáčky z PVAL po 5 ml, 10 ml nebo 25 ml balené v PS krabičkách: až 250 ml (50 sáčků po 5 ml, 25 sáčků po 10 ml nebo 10 sáčků po 25 ml). *EVOH = etylenvinylalkohol = PVAL = polyvinylalkohol

4.2.1. Návod k danému způsobu použití

- Při přizpůsobování ošetření zohledněte vývojové stádium a vlastnosti cílového hmyzu. Zaměřte se zejména na nejcitlivější vývojové stádium cílového organismu, na načasování aplikace a ošetřované plochy.

- Využívejte metody integrované ochrany proti škůdcům, jako je kombinace chemických, fyzických a dalších metod ochrany veřejného zdraví, s ohledem na lokální specifika (klimatické podmínky, cílové druhy, podmínky použití atd.).

- Vyhněte se výhradnímu a opakovanému použití insekticidů ze stejné podskupiny. Podle klasifikace IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) patří etofenprox do podskupiny 3A. (<https://irac-online.org/mode-of-action/classification-online/>).

- Střídejte přípravky s různými účinnými látkami s různými způsoby účinku (tj. s odlišnou klasifikací IRAC).

- Přípravek by měl být aplikován na vyhrazená místa, která nejsou pravidelně umývána a ve kterých se mohou skrývat cílové organismy, např. rošty a nohy postelí, pod nábytkem, podél podlahových lišt, za čelem postele, na stěně za postelí a nábytkem a v různých otvorech a ve štěrbinách.

4.2.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

- Při míchání a plnění používejte ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

- Během stříkání používejte ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku), nepropustnou kombinézu a dýchací masku (APF 4).

- Při čištění stříkacího zařízení používejte ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku) a potaženou kombinézu.

- U lůžkovin aplikaci přípravku omezte na rám a rošt postele.

- Přípravek neaplikujte na matrace, ložní prádlo a polštáře.

- Matrace, ložní prádlo a polštáře je třeba ošetřit jiným způsobem.

4.2.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.2.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ¹

5.1. Návod k použití

- Povrchy čistěte až po ošetření (až 12 týdnů v závislosti na cílových organismech).
- Pokud ošetření nepomůže, informujte o tom držitele povolení.
- Před použitím vždy rozpust'te ve vodě celé sáčky.

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

- Přípravek by neměl být aplikován na místech přístupných dětem a domácím zvířatům.
- Pokud přípravek aplikujete na místo přístupné dětem, zamezte jim na dané místo přístup, dokud nebude ošetření ukončeno a místo očištěno.
- Před ošetřením odstraňte všechny potraviny a nápoje.
- Přípravek neaplikujte přímo na potraviny, povrchy nebo náčiní, které mohou přijít do styku s potravinami nebo nápoji určenými ke konzumaci (lidmi nebo zvířaty) nebo s hospodářskými zvířaty, ani v jejich blízkosti.
- Zakryjte všechny povrchy a zařízení, které mohou přijít do styku se zvířaty, potravinami a nápoji určenými ke konzumaci lidmi nebo zvířaty.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

- V PŘÍPADĚ EXPOZICE NEBO PODEZŘENÍ NA EXPOZICI: Vyhledejte lékařskou pomoc.
- V PŘÍPADĚ NADÝCHÁNÍ: Pokud se objeví příznaky, kontaktujte toxikologické informační středisko nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
- V PŘÍPADĚ POŽITÍ: Pokud se objeví příznaky, kontaktujte toxikologické informační středisko nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
- V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži tekoucí vodou. Pokud se objeví příznaky, kontaktujte toxikologické informační středisko nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Pokud se objeví příznaky, propláchněte oči tekoucí vodou.
- Máte-li nasazené kontaktní čočky a lze je snadno vyjmout, vyjměte je.
- Kontaktujte toxikologické informační středisko nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
- Mějte po ruce obal přípravku nebo návod k použití.

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

- Nepoužitý přípravek, obal a případný další odpad zlikvidujte patřičným způsobem.
- Biocidní přípravek nevylévejte do kanalizace (umyvadla, toalety apod.), okapů, vodních toků, na volná prostranství nebo do jiných venkovních prostředí.

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

Doba použitelnosti: 3 roky v původním balení.

¹Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402